

Акция по вакцинации в мобильных пунктах г. Оберхаузен
Вакцинация векторной вакциной компании Johnson & Johnson.
Во вторник, 25 мая, и в четверг, 27 мая 2021 года

Рекомендации для лиц 60 лет и старше, а также лиц моложе 60 лет

С начала вакцинации в нескольких редких случаях как при вакцинации препаратом Vaxzevria[®], так и COVID-19 Vaccine Janssen[®], причем почти исключительно у лиц в возрасте моложе 60 лет, имели место серьезные побочные эффекты (см. ниже «Возможны ли при вакцинации осложнения?»).

Для лиц в возрасте 60 лет и старше Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) рекомендует вакцинацию препаратом Vaxzevria[®] или COVID-19 Vaccine Janssen[®]. Данная рекомендация основывается на том, что векторные вакцины от COVID-19 в данной возрастной группе показали высокую эффективность, а риск тяжелого заболевания COVID-19 и смерть от COVID-19 существенно выше, чем у более молодых лиц, и, наконец, на том, что описанные в разделе «Возможны ли при вакцинации осложнения?» побочные эффекты проявлялись практически исключительно у лиц моложе 60 лет.

Для лиц моложе 60 лет вакцинация препаратом Vaxzevria[®] или COVID-19 Vaccine Janssen[®], согласно рекомендации STIKO, также возможна после консультации врача и при индивидуальной готовности прививаемого лица согласиться на возможные риски. Для индивидуальной оценки рисков вакцинируемым лицом должны быть взвешены, с одной стороны, риск описанных осложнений, а с другой стороны - риск инфицирования SARS-CoV-2 или заболевания COVID-19. При этом следует, во-первых, учесть то, что описываемые ниже сгустки крови (тромбозы) с одновременным снижением тромбоцитов (тромбоцитопения) в соответствии с актуальными данными очень редко наблюдались и у лиц моложе 60 лет (менее 0,01% вакцинированных лиц в данной возрастной группе). Во-вторых, необходимо индивидуально оценить, имеется ли повышенный индивидуальный риск инфицирования SARS-CoV-2 (например, семейные и рабочие обстоятельства и поведение) или повышенный индивидуальный риск заболевания тяжелой формой COVID-19, возможно, со смертельным исходом (например, на фоне уже имеющихся заболеваний).

Возможны ли осложнения при вакцинации?

Осложнения при вакцинации - это выходящие за обычные рамки реакции на вакцину последствия вакцинации, которые оказывают существенное воздействие на состояние здоровья вакцинируемого лица.

COVID-19 Vaccine Janssen®: В редких случаях (от 0,01% до 0,1%) проявлялись реакции гиперчувствительности и крапивница. Помимо этого, после вакцинации препаратом COVID-19 Vaccine Janssen® в очень редких случаях (менее 0,01%) наблюдались сгустки крови (например, в мозгу в виде тромбоза синусовой вены или же в брюшной полости), связанные со снижением тромбоцитов (тромбоцитопения) и частично со смертельным исходом. Такие случаи имели место в течение 3 недель после вакцинации и преимущественно у лиц моложе 60 лет. Эти случаи в настоящее время тщательно проверяются.

После начала вакцинации в очень редких случаях сообщалось об аллергических реакциях немедленного типа (анафилактических реакциях). Они проявлялись в течение короткого времени после вакцинации и требовали медицинского лечения.

В принципе – как и при любых вакцинах – в редких случаях нельзя исключить аллергической реакции немедленного типа вплоть до шока или иных, не известных ранее осложнений.

Если после вакцинации проявляются симптомы, которые выходят за рамки указанных выше быстро проходящих локальных или общих реакций, Вам, разумеется, следует проконсультироваться со своим врачом. При серьезных расстройствах, таких как одышка, боли в груди, отеки ног, сохраняющиеся боли в животе или нарушения зрения, или если спустя несколько дней после вакцинации у Вас проявляются сильные или постоянные головные боли или гематомы либо точечные кровоизлияния в кожу не в месте укола, немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Своей подписью под данным медицинским разъяснением Вы заявляете о том, что поняли смысл и возможные побочные эффекты вакцинации и в соответствии с индивидуальной готовностью нести описанные риски побочных эффектов выражаете свое особое согласие на вакцинацию препаратом Covid-19 Vaccine Janssen, даже если Вам еще не исполнилось 60 лет.